


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 7

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

08/07/2024 - 14/07/2024










COMPRESORIO - RC - LITORALE TIRRENICA

BAGNARA CALABRA
GIOIA TAURO
PALMI
RIZZICONI
SEMINARA

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	18	5	10%	STAZIONARIO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
08/07/2024	09/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	13/07/2024	14/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): rilevato un leggero decremento della presenza di adulti nelle trappole da monitoraggio. Le temperature attuali con valori max compresi 34,46°C - 35,06°C e umidità media compresa tra 42,5 - 51,05 (dati rilevati dalle stazioni meteo CVO coop) possono condizionare la vitalità del fitofago riducendo la fertilità delle femmine, mortalità delle uova e delle larve. Allo stato attuale il trattamento chimico è consigliato per le sole varietà a drupa grossa. La strategia di difesa contro il fitofago consiste nell'utilizzo di prodotti registrati per la tignola dell'olivo ed inoltre, le aziende devono attenersi scrupolosamente al metodo di coltivazione adottato. Si consiglia di eseguire i trattamenti al mattino o il tardo pomeriggio con temperature comprese 30 e 32 °C.

N.B. da disciplinare di agricoltura integrata, l'intervento chimico è giustificato solo per la generazione carpofoaga per un max di 1 trattamento. I prodotti ammessi da disciplinare sono: *Bacillus thuringiensis*, *Spinetoram* e *Acetamiprid*.

Per maggiori informazioni siete invitati a contattare i Tecnici di riferimento:
DOTT. AGR. DOMENICO MANCO. CELL. 3286173864