


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 7

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

08/07/2024 - 14/07/2024










COMPRENSORIO - VV - COSTA VIBONESE

BRIATICO
CESSANITI
DRAPIA
JOPPOLO
NICOTERA
PARGHELIA
PIZZO
RICADI
SPILINGA
TROPEA

VIBO VALENTIA
ZACCANOPOLI
ZAMBRONE
ZUNGRI

| STADIO FENOLOGICO | CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA) | OLIVE INFESTATE % | SOGLIA DI INFESTAZIONE | TENDENZA | LIVELLO DI CRITICITA' |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| INDURIMENTO DEL NOCCIOLO | 106 | 0 | 10% | MIGLIORAMENTO | ALTO |

PREVISIONI METEO

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 08/07/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 14/07/2024 |

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): rilevato un leggero decremento della presenza di adulti nelle trappole da monitoraggio e in alcune aziende è stata rilevata la presenza di uova deposte al peduncolo della drupa. Le temperature attuali con valori max compresi 34,46°C - 35,06°C e umidità media compresa tra 42,5 - 51,05 (dati rilevati dalle stazioni meteo CVO coop) possono condizionare la vitalità del fitofago riducendo la fertilità delle femmine, mortalità delle uova e delle larve. Come indicato nel precedente bollettino le piante di ulivo si trovano nella fase fenologica dell'indurimento del nocciolo, in questa fase per tutte le varietà a drupa grossa del comprensorio è consigliabile attuare una strategia di difesa contro il fitofago utilizzando prodotti registrati per la tignola dell'olivo e attenersi scrupolosamente al metodo di coltivazione adottato dall'azienda. Si consiglia di eseguire i trattamenti al mattino o il tardo pomeriggio con temperature comprese 30 e 32 °C.

N.B. da disciplinare di agricoltura integrata, l'intervento chimico è giustificato solo per la generazione carpofoaga per un max di 1 trattamento. I prodotti ammessi da disciplinare sono: *Bacillus thuringiensis*, *Spinetoram* e *Acetamidid*.

Per maggiori informazioni siete invitati a contattare i Tecnici di riferimento:

DOTT. AGR. DOMENICO MANCO. CELL. 3286173864